

Система питания ранней моркови

Биологический вынос на тонну продукции: N: 2,3-4 кг P2O5: 1-1,8 кг K2O: 5-6,7 кг MgO: 1-2 кг CaO: 1-2 кг	Посев	11-25 день		26-42 день				43-59			60-80 день		

Программа листовых подкормок

Улучшение роста корней		Икар Фосто 0,7 л/га												
Контроль стресса		Филлотон 1-1,5 л/га раз в 5-7 дней												
Улучшение вегетативного роста		Го Дрип Макс, 1 кг/га раз в 5-7 дней												
Улучшение налива корнеплодов						Го дрип 10.20.30, 1 кг/га раз в 5-7 дней								
Снижение содержания нитратов						Икар Элаис, 2 л/га			Икар NB-Мо, 1,5 л/га					
Предуборочная сеникация													Икар Калисто 2,5 л/га	
Улучшение качества обработки		Икар Перфект Стик 20 мл на 100 л рабочего раствора												

Система корневого питания, кг/га

Диаммофоска - подготовка почвы	700														
ЯраМила Комплекс - при посеве	170														
Кальцинит		10	10	14	14	14	16	16	18	18	16	12	10		
Сульфат магния				10	10	10	10	8,1	8,1	8,1	8,1	8	8	8	
Нитрат калия		3	3	3	8	8	8	16	25	40	40	35	16	8	8
Монокалийфосфат		8	8	8	6	6	6	6	39	39	39	39			
Аммиачная селитра		15	17	17	15	15	15	15	34	34	23	23			
Го Дрип Микро		0,5	1	1	2	2	3	3	1,5	1,5	1	1			
Фульвумин	10*				2	2	2	2	2	2	1,5	1,5			

* Опрыскивание почвы после посева для предотвращения образования почвенной корки. Норма вылива рабочего раствора 400 л/га

<http://youtube.com/СунерАрпо>

http://instagram.com/agro_super

<http://superagro-rus.com/>